

meen, zijn floristisch en zelfs genetisch werk getuigen van zijn veelzijdigheid.

Zijn grote impulsiviteit en productiviteit zijn oorzaak dat hij zich wel eens te snel een bepaalde mening vormde, die aanvechtbaar bleek te zijn en door anderen bij nader onderzoek werd betwist. Dit ging niet altijd zonder persoonlijke gevoeligheden van weerskanten. Zodoende waren er onder zijn vakgenoten, vooral onder de meer bezadigden, niet weinigen, die tegenover hem een zekere reserve in acht namen. Desondanks zal hij blijven voortleven als een der grote entomologen van onze tijd, die door zijn rijkdom aan gedachten, door zijn onstuimige geest en zijn grote kennis veel tot de uitbreiding en verdieping onzer wetenschap heeft bijgedragen. Hij ruste in vrede. — W. ROEPKE.

Note on *Bombus jonellus* (Kirby)

by

G. KRUSEMAN

Mr. M. GUILLEASH has had the kindness to send me a series of *Bombus jonellus* (Kirby) from the Isle of Man.

As the hairs of the corbicula, which are red in *B. j. jonellus* (Kirby), are in many specimens totally black and in the remaining specimens at most black with red tips, the population of the Isle of Man does not belong to the above subspecies. Neither do these specimens belong to *B. j. hebridensis* Wild. They are closely related to *B. j. subborealis* Richards, but they differ in the particular greenish-yellow colour of the light bands.

I name this new subspecies *B. jonellus monapiae* n.ssp. The name is derived from Monapia, the old Roman name for the Isle of Man.

Description of ♀ and ♂:

Vertical tuft on the vertex with a mixture of yellow and black hairs. The prothoracal band moderately broad, scutellum greenish yellow, first segment and base of second segment greenish yellow. The apical margin of the third segment often black, base of fourth segment sometimes black.

Tergites 4—6 white, somewhat buffish.

Holotype 1 ♀ Isle of Man, Manghold, 1953.

Morphotype 1 ♂ of the same locality.

Paratypes 33 ♂, idem.

Types in Zoölogisch Museum, Amsterdam; one paratype in the British Museum (Natural History), and one paratype in the collection of Mr. GUILLEASH.

I have the following additions to the range of *B. j. subborealis* Richards:

In the collection of the Zoölogisch Museum of Amsterdam is a series of this subspecies from Abisko, Swedish Lapland, and two specimens from Finland: 1 ♀ Nokia Ta, leg. GRÖNBLOM, 11.V.1947, 1 ♂ Pärno, leg. NORDSTRÖM.

Amsterdam-O., Zeeburgerdijk 21, September 1953.

Correcties. In een gedeelte van de oplage staat boven het artikel van de heer NIJVELDT, dat een galgmug schadelijk is voor de griendcultuur. Natuurlijk is met dit sinistere dier een galmug bedoeld (p. 355).

p. 365, regel 17 van onderen, natuur moet zijn: nervatuur.

p. 368, regel 4 van onderen, Hesitella moet zijn: Hirsutella.